

ProCura Klorsept

Dezinfekční prostředek v šumivých tabletách

k dezinfekci ploch, povrchů, pracovních ploch, nástrojů, laboratorního skla, kojeneckých lahví, chladících a sanitárních zařízení ve stravovacích provozech, příborů apod.

Široké spektrum účinku, výborná materiálová snášenlivost, krátká expozice a přesné dávkování.

Vlastnosti a použití:

Dezinfekční roztok se připraví rozpuštěním příslušného množství tablet ve vodě. Před dezinfekcí je třeba odstranit zbytky bílkovinné povahy (krev, hnis, hlen). Předměty přicházející do styku s jídlem vždy opláchněte pitnou vodou. Dodržujte doporučené expozice.

Dávkování a expozice:

Běžné použití:

1tbl/5l vody 15min. - baktericidní, omezeně virucidní,

1tbl/5l vody 30min. - baktericidní, plně virucidní (poliovirus), fungicidní

2tbl/5l vody 30min. - baktericidní, plně virucidní, tuberkulocidní, fungicidní, MRSA

1tbl/1l vody 30min. - baktericidní, plně virucidní, sporicidní (*Clostridium difficile*), tuberkulocidní, fungicidní, MRSA

Silně biologicky znečištěné plochy (tělní tekutiny...) - možno ve formě granulí

10tbl/1l vody 15min. - baktericidní, plně virucidní, sporicidní (vč. *Clostridium difficile*), tuberkulocidní, fungicidní, MRSA

Spektrum účinku: A,B,C,T,M,V

Účinné látky: Troklosen natrium

Bezpečnostní upozornění: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Dráždí oči a dýchací orgány. Vysoce toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár. Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin. Uchovávejte v suchu a v originálním, dobře uzavřeném obalu. V případě zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požáru, nebo výbuchu nevdechujte dýmy. Používejte ochranné prostředky na kůži a ochranné brýle. Biocidní produkt.

Skladujte v osuchu, v dobře uzavřeném originálním balení. V dobře větraných místnostech do teploty 25°C.

Balení: 733g dóza (200 tablet á 3,3g)